

LIFTING DE LA LÈVRE

DEFINITION :

La lèvre supérieure comprends une partie blanche qui va d'en-dessous du nez jusqu'à la lèvre rouge. Cette partie est généralement courte chez les sujets jeunes permettant d'entrevoir une partie des incisives supérieures lorsque la bouche est entrouverte. Lorsque cette partie est trop longue, cela donne un aspect disgracieux. Cela est plutôt rare chez les sujets jeunes mais apparaît avec l'âge, alors en parallèle avec la réduction de la hauteur de la lèvre rouge donnant un aspect « lèvre pincée ».



Le but de l'intervention est de raccourcir la hauteur de la lèvre supérieure.

LA TECHNIQUE :



La technique consiste à retirer une hauteur de peau sous la base du nez au niveau des narines pour que la cicatrice soit cachée. Elle est en général réalisée sous anesthésie locale sans hospitalisation.

Il vaut mieux éviter les médicaments contenant de l'aspirine ou des anti-inflammatoires les 10 jours avant et 10 jours après. Il faut bien sûr avoir arrêté toute forme de nicotine trois mois avant et trois mois après pour éviter les troubles de la cicatrisation ou de lâchage de suture.

SUITES OPERATOIRES :

La douleur est peu importante, et combattue par du paracétamol.

La cicatrice peut être rose pendant une quinzaine de jours. Il faut bien sûr éviter de faire cette chirurgie pendant l'épidémie de grippe ou en période d'allergies saisonnières, pour ne pas avoir d'écoulement sur la cicatrice ou d'être obligé de se moucher. Il y aura un certain degré de gonflement et parfois des bleus pendant une quinzaine de jours.

COMPLICATIONS POSSIBLES

- Infection ou micro-abcès sur les fils : cela nécessitera des soins locaux et parfois un traitement antibiotique.
- Anomalies de cicatrisation : retard de cicatrisation, lâchage de suture, cicatrices hypertrophiques. Chaque situation nécessitera un traitement adapté qui vous sera expliqué le cas échéant.
- Kystes épidermiques : à traiter avec une petite aiguille au besoin.

RESULTATS :

Il ne peut être jugé qu'au bout de 6 mois.

Mais rien n'est éternel : les lèvres subiront les méfaits du temps et de la pesanteur, ainsi que certaines mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme. La pérennité du résultat ne pourra être garantie !

COUT :

1350 euros environ comportant les honoraires chirurgicaux et le coût de la salle opératoire.