

LIFTING SOURCILS


DEFINITION :

La position trop basse des sourcils résulte souvent de l'action de la pesanteur : affaissement progressif lié à l'âge, donnant un regard lourd.

Cette intervention consiste en la remise en place (plus haut) des sourcils par le retrait d'un croissant de peau au dessus des sourcils. La cicatrice est à ras des poils de sourcils, et peut être tatouée secondairement pour faire partie des sourcils.

Cela peut concerner uniquement la partie latérale (la queue des sourcils) ou sa totalité. Cette chirurgie ne résout pas le problème de l'excès dermique des paupières supérieures.

D'autres moyens, avec une action moindre et moins durables existent (Botox, échauffement de la peau du front par radiofréquence fractionnée microneedling ou Plasmalpen ou laser). L'avantage de ces derniers est l'absence de cicatrice.



Elle est en général réalisée sous anesthésie locale sans hospitalisation. Une certaine surcorrection initiale est nécessaire.

Il vaut mieux éviter les médicaments contenant de l'aspirine ou des anti-inflammatoires les 10 jours avant et 10 jours après.

Il faut bien sûr avoir arrêté toute forme de nicotine trois mois avant et trois mois après pour éviter les troubles de la cicatrisation ou de lâchage de suture.

SUITES OPERATOIRES :

La douleur est peu importante, et combattue par du paracétamol. La cicatrice peut être rose pendant une quinzaine de jours. Il y aura un certain degré de gonflement et parfois des bleus pendant une quinzaine de jours. Il faut éviter l'exposition solaire tant que les cicatrices sont rouges. Une certaine perturbation de la sensibilité de la peau du front au dessus des cicatrices est fréquentes pendant quelques semaines à quelques mois.

COMPLICATIONS POSSIBLES

- Infection ou micro-abcès sur les fils : cela nécessitera des soins locaux et parfois un traitement antibiotique.
- Anomalies de cicatrisation : retard de cicatrisation, lâchage de suture, cicatrices hypertrophiques. Chaque situation nécessitera un traitement adapté qui vous sera expliqué le cas échéant.

RESULTATS :

Il ne peut être jugé qu'au bout de 6 mois.

Durabilité : **rien n'est éternel** : les sourcils subiront les méfaits du temps et de la pesanteur. La pérennité du résultat ne pourra être garantie !

COÛT :

1350 euros environ comportant les honoraires chirurgicaux et le coût de la salle opératoire.

Il n'y a pas de participation financière de la Caisse d'Assurance Maladie ou des complémentaires santé.



Fin de chirurgie



Résultats à 1,5 mois